

# Braunoderm®



## Dezynfekcja skóry

- Szybki czas działania
- Doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające
- Szerokie spektrum działania
- Bardzo dobra tolerancja

# Braunoderm®

Jodowo-alkoholowy roztwór do odkażania nieuszkodzonej skóry

## Charakterystyka

Braunoderm® to gotowy do użytku alkoholowy roztwór do dezynfekcji skóry przeznaczony do stosowania na oddziałach szpitalnych, na sali operacyjnej oraz w gabinetach lekarskich. Substancje czynne 2-propanol i powidon jodu charakteryzują się szerokim spektrum skuteczności antibakteryjnej.

## Właściwości

- Pełne spektrum działania obejmujące: bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki
- Szybki czas działania – 15 sekund
- Zawiera jedynie 50 % alkoholu i 1% PVP jodu
- Doskonałe własności czyszczące i odtłuszczające
- Ułatwia dobre przyleganie folii przy zabiegach chirurgicznych
- Bardzo dobrze tolerowany przez skórę, znikome ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych i uczuleniowych

## Zastosowanie

Nierozcieńczony Braunoderm nanieść na skórę pola operacyjnego/zabiegowego i rozprowadzić jałowym wacikiem. Odkażoną powierzchnię skóry należy dokładnie zwilżyć, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar produktu zebrać wacikiem.

- Minimalny czas aplikacji w przypadku skóry ubogiej w gruczoły tojowe wynosi 15 sekund (zastrzyki, punkcje).
- W zabiegach typu punkcje stawów, jam ciała i przed operacjami minimalny czas aplikacji to 1 minuta

Odkażanie nieuszkodzonej skóry przed:

- operacjami
- wstrzyknięciami
- nakłuciami
- cewnikowaniem żył
- pobieraniem próbek krwi
- szczepieniami

## Skuteczność mikrobiologiczna

- Bakterie (w tym MRSA) 15 s
- Tbc 30 s
- Wirusy otoczkowe ( HCV, HBV, HIV ,Vaccina) 30 s
- Grzyby 15 s
- Polio 2 min
- Pierwotniaki

## Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną- jod, alkohol izopropylowy lub inny składnik produktu; nadczynność tarczycy lub inne choroby tarczycy; opryszczkowe zapalenie skóry; na 1 -2 tygodnie przed i po terapii radioaktywnym jodem.

Nie stosować u noworodków (zwłaszcza wcześniaków) oraz niemowląt do 6 miesiąca życia.

## Interakcje:

Preparatu Braunoderm nie należy stosować z produktami zawierającymi: rtęć, srebro, taurolidyny i nadtlenek wodoru ze względu na ryzyko wystąpienia inaktywacji którejś z w/w substancji. Powidon jodu wchodzi w reakcje z białkami i niektórymi substancjami organicznymi co może osłabiać jego działanie.

## Ostrzeżenia specjalne:

Unikać kontaktu produktu leczniczego Braunoderm z oczami i błonami śluzowymi. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia nadczynności tarczycy – w razie konieczności należy przeprowadzić kontrolę czynności tarczycy.

Nie stosować na uszkodzoną lub zmienioną chorobowo skórę. Produkt łatwopalny, nie stosować urządzeń elektrycznych, np. elektrody na skórę wilgotną.

## Okres ważności:

Okres ważności preparatu leczniczego Braunoderm® wynosi 2 lata.

Po pierwszym otwarciu, okres ważności wynosi 12 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

B. Braun Melsungen AG  
Carl-Braun Straße 1  
D-34212 Melsungen , Niemcy

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Świadectwo Rejestracji nr 11655/M/99

Pozwolenie nr 13040



## Dostępne opakowania

## Numer katalogowy

butelka o poj. 250 ml z atomizerem	18307
butelka vario o pojemności 1000 ml	18308
kanister o pojemności 5 L	18309
atomizer do butelki o poj. 1000 ml	3908012

## Braunoderm® – skład

100 g roztworu zawiera: 50 g alkoholu izopropylowego, 1g jodopowidonu, substancje pomocnicze; jodek potasu, żółcień pomarańczowa, czerwień koszenilowa, czerwień brylantowa, diwodorofosforan dwuwodny, wodę oczyszczoną.