

Prontoderm® Roztwór

... najlepsze rozwiązanie problemu dekontaminacji MRSA



Dekontaminacja MRSA

- Nie wymaga spłukiwania
- Do stosowania w higienie i dekontaminacji również stomijnej
- Skuteczny wobec bakterii w tym MRSA i grzybów w 30 sekund
- Do stosowania w ginekologii i przed cewnikowaniem

Prontoderm® Roztwór

... najlepsze rozwiązanie problemu dekontaminacji MRSA

Charakterystyka

Prontoderm roztwór to higieniczny, gotowy do użycia preparat myjący. Służy do mycia ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi i eradykacji MRSA.

Produkt zawiera poliheksanidynę, która:

- nie wysusza skóry i błon śluzowych
- nie drażni
- jest nietoksyczna
- daje najlepszą miejscową tolerancję skórą

Niemieckie Towarzystwo Higieny Szpitalnej rekomenduje produkty zawierające poliheksanidynę do higieny całego ciała.

Właściwości

- Efektywna dekontaminacja MRSA również w stomii
- Sprawdzony i uznany w oparciu o nowe zalecenia DGHM i standardy europejskie
- Bezbolesne stosowanie również w ginekologii
- Najwyższa tolerancja skórna
- Najwyższa tolerancja tkankowa
- Usuwa nieprzyjemne zapachy
- Przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadku pacjentów o wrażliwej skórze
- Brak przeciwwskazań, przy stosowaniu zgodnie z instrukcjami
- Nie musi być spłukiwany lub zmywany (Formuła leave on)
- Bezbarwny
- Może być używany do 8 tygodni po otwarciu opakowania -skuteczny przez 24 godziny

Zastosowanie

- mycie twarzy,
- uszu,
- nosa,
- górna część ciała,
- dolna część ciała,
- krocze, cewka moczowa – miejsce umieszczenia cewnika,
- nogi,
- Ścierkę zamaczać w roztworze tylko raz. Nigdy nie zanurzać w roztworze użytej ścierki. Umyć wybrane partie ciała.

- Używać osobnych ścierek do mycia włosów, twarzy i każdego ramienia, brzucha, pleców, każdej nogi i genitaliów np. przed cewnikowaniem
- Po zakończeniu mycia tkaninę wyrzucić
- Umyte partie ciała przed wysuszeniem pozostawić wilgotne na co najmniej 1 minutę
- Ręce myć od palców w stronę ramion
- Włosy umyć roztworem lub pianką Prontoderm®, pozostawiając preparat na 3-5 minut, aby zadziałał
- Wysuszyć włosy
- Patyczkami kosmetycznymi nasączonymi w roztworze Prontoderm® wyczyścić przedsionki jamy nosowej
- Patyczki kosmetyczne zwilżyć (nie nasycać) roztworem Prontoderm® i umyć uszy
- Umyć twarz
- Po 1-2 minutach oddziaływania roztworu twarz wysuszyć
- Kończyny górne myć od palców w stronę barków
- Górną część ciała myć z góry ku dołowi
- Dokładnie oczyścić pępek
- Plecy myć od góry ku dołowi, przed położeniem na plecach zmienić prześcieradło na czyste
- Nogi myć od bioder do palców

Skuteczność mikrobiologiczna

Bakterie 30 sekund

w tym MDRO (Multi-Drug Resistant Organism) np.
Staphylococcus aureus, MRSA
Enterococcus hirae
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumannii
Enterococcus faecium (VRE)
Klebsiella pneumoniae (ESBL)

Grzyby 30 sekund

Candida albicans

Skuteczność wobec MRSA oznacza działanie przeciw wszystkim szczepom Staphylococcus aureus opornym wobec antybiotyków beta-laktamowych. Do tej grupy antybiotyków należą: penicyliny, metycyliny, dicloxaciliny, nafciliny, oxaciliny. W związku z powyższym wykazane jest działanie bójcze wobec m.in. ORSA (Oxacillin resistant Staphylococcus aureus).



Dostępne opakowania

Numer katalogowy

Prontoderm® Roztwór

butelka o poj. 500 ml	400121
butelka o poj. 5 litrów	400123